

Baseline Demographic Characteristics

	%	number
total no.	100%	295
Mean Age (y)		58.07
Age category (y)		
<44	9.5%	28
45 ≤ ≤ 64	59.7%	176
65 ≤ ≤ 74	24.1%	71
≥ 75	4.1%	12
Sex		
men	52.5%	155
women	47.5%	140
Daialysis Duration (y)		
mean(y)	15.9	
<5	4.4%	13
5 ≤ <10	19.3%	57
10 ≤ <15	20.0%	59
15 ≤	28.5%	84
DM		
あり	7.5%	22
なし	92.5%	273
原疾患		
慢性糸球体腎炎	28.8%	85
多発性嚢胞腎	4.7%	14
IgA腎症	3.7%	11
移植後再導入	1.4%	4
腎硬化症	3.1%	9
慢性腎盂腎炎	1.0%	3
慢性腎炎	1.0%	3
ループス腎炎	0.3%	1
閉塞性尿路障害	0.3%	1
ネフローゼ症候群	0.3%	1
妊娠中毒	0.3%	1
妊娠腎	0.3%	1
尿管逆流性腎症	0.3%	1
タンパク尿	0.3%	1
尿管逆流性腎症	0.3%	1
その他HT	0.3%	1
水腎症	0.3%	1
シスチン尿症	0.3%	1
SEL	0.3%	1
nephrotic syndrome	0.3%	1
MPGN	0.3%	1
calcifilaxis	0.3%	1
Alport Synd	0.3%	1
先天性腎低形成	0.3%	1
不明	5.4%	16
内科的治療		
1α (OH)D3 po	5.1%	15
1, 25(OH)2D3 po	4.1%	12
Falecalcitriol po	3.4%	10
Maxacalcitol iv	35.6%	105
Calcitoliol iv	3.1%	9
Cinacalcet hydrochloride	49.5%	146
Sevelamer hydorochloride	34.9%	103
Caco3	27.5%	81
Lanthanum Carbonate	21.7%	64
インターベンション		
PEIT	3.7%	11
PMIT	0.3%	1
PCIT	0.3%	1
その他	0.0%	0

		%	number
手術			
初回		80.7%	238
再手術		12.9%	38
持続性		21.1%	8
再発		76.3%	29
3HPT		5.4%	16
再手術 +3HPT		0.7%	2
再発部位			
頸部		21.1%	8
縦隔		13.2%	5
移植腺		63.2%	24
頸部＋移植腺		2.6%	1
鎖骨下		2.6%	1
右肩		2.6%	1
死亡			
死亡 あり		0.3%	1
死亡 なし		92.3%	265
不明		7.3%	21
死因 sudden death			1
摘出腺数			
Mean			3.80
1	1.3%		3
2	3.8%		9
3	16.0%		38
4	71.4%		170
5	7.1%		17
空白	0.4%		1
総摘出腺重量	Mean		1779.3
PTX後mini-PTH	Mean		46.1
副甲状腺癌	あり	0.0%	0
Parathyromatosis	あり	0.3%	1
甲状腺癌	あり	3.1%	9
反回神経麻痺			
あり		3.8%	11
持久性		27.3%	3
一過性		72.7%	8
なし		87.1%	250
空白		12.5%	36
術後創部出血再手術			
あり		0.0%	0
なし		88.2%	253
空白		13.2%	38
合併症			
その他合併症	なし		252
6病日に急性心筋梗塞発症			1
気管支肺炎			1
術後肺炎			1
他院で鏡下視縦隔遺残腺摘出			1
術後2週間でi-PTH617MBiンチ右下hot(+)患者再手術拒否			1
術後1.5ヵ月後転院先で原因不明心停止蘇生数日後死亡			1
上気道狭窄(舌根沈下)			1
誤嚥性肺炎			1
Basedow's dis			1
前腕筋肉内			1
空白			26
術式			
全摘出術のみ		18.3%	42
亜全摘出術		2.2%	5
全摘手術後 自家移植(前腕)		71.7%	165
腫大腺のみ切除		7.8%	18

PTX前臨床検査値		
i-PTH	(pg/mL)	746.36
w-PTH	(pg/mL)	418.72
s-Ca	(mg/dL)	9.82
アルブミン	(g/dL)	4.51
P	(mg/dL)	5.53
総ALP	(IU/L)	453.85
骨ALP	(IU/L)	60.09
オステオカルシン	(ng/mL)	123.73

PTX時所見	number
生死 生	272
生死 死	1
生死 空白	22
虚血性心疾患 あり	11
虚血性心疾患 なし	104
弁疾患 あり	13
弁疾患 なし	102
心不全 あり	7
心不全 なし	107
脳血管障害 あり	1
脳血管疾患 なし	114
大動脈剥離破裂 あり	1
大動脈剥離破裂 なし	114
ASOによる下肢切断 あ	0
ASOによる下肢切断 な	115
骨折 あり	5
大腿骨	1
手指	1
腰椎圧迫骨折	1
右第3趾	1
骨折 なし	110
持続性HPT・再手術 あり	3
持続性HPT・再手術 なし	102
再発・再手術 あり	6
再発・再手術 なし	99

Age Category

Mean Age = 58.07 (year)


<44,
9.5%

$45 \leq \leq 64$,
59.7%


$65 \leq \leq 74$,
24.1%

≥ 75 ,
4.1%


0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%



Dialysis Duration (year)



Sex





DMの有無




原疾患


- 慢性糸球体腎炎
- 多発性嚢胞腎
- IgA腎症
- 移植後再導入
- 腎硬化症
- 慢性腎盂腎炎
- 慢性腎炎
- ループス腎炎
- 閉塞性尿路障害
- ネフローゼ症候群
- 妊娠中毒
- 妊娠腎
- 尿管逆流性腎症
- タンパク尿
- 尿管逆流性腎症
- その他HT
- 水腎症
- シスチン尿症
- SEL
- nephrotic syndrome
- MPGN
- calcifilaxis
- Alport Synd
- 先天性腎低形成
- 不明








手術




再手術に至った理由



0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%


再発部位




死亡の有無




摘出腺数



術後創部出血再手術



その他合併症



術式

